

TROPAEOLACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Rosidae)

29. *Tropaeolum majus* L.

Cast.: Capuchina

Eusk.: Amatxi lore



Caracteres diagnósticos:

Hierba anual o perenne, de tallo delgado, postrado o trepador por medio de los **pecíolos** foliares que actúan como zarcillos. Hojas **alternas**, con limbo de nerviación actinódroma y orbicular o ligeramente anguloso, de 4-15 cm, **peltadas** (pecíolo inserto aproximadamente en el centro del limbo). Flores grandes (3-6 cm de diámetro), **zigomorfas**, con largos pedúnculos, solitarias en las axilas de las hojas. Cáliz pentámero, con el sépalo dorsal prolongado en un **espolón** de 2-4 cm. Corola pentámera de pétalos libres, grandes, amarillos o **anaranjados** hasta **casi rojos**, los dos superiores con manchas más oscuras, los tres inferiores ciliados en la base. 8 estambres. Ovario súpero trilobular con un primordio seminal en cada lóculo, que forma un esquizocarpo en la fructificación.

Florece durante la primavera y el verano.

Forma vital: Terófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Cultivada como ornamental en lugares de clima suave en toda la Península, y a veces naturalizada sobre suelos alterados próximos a núcleos de población.

Distribución general:

Originaria de Suramérica (Perú-Colombia). Muy cultivada como ornamental.