

67. *Convallaria majalis* L.

Cast.: Lirio de los valles, muguete

Eusk.: Mugeta



Convallaria majalis (tomada de Kohler 1887)



Caracteres diagnósticos:

Hierba perenne mediante un rizoma alargado y ramificado que produce cada año las hojas y las flores en sus extremos. Hojas alternas y amplexicaules. Cada brote aéreo tiene normalmente unas 4 hojas basales de protección, sin limbo (catafilos), y fusionadas por sus márgenes en forma de vainas. Tras éstas se producen **2 hojas fotosintéticas** de color verde claro, con la base también envainadora y algo prolongada en una especie de pecíolo que termina en un limbo elíptico-lanceolado, con nerviación acródroma y ápice agudo. La inflorescencia aparece lateralmente, y consiste en un **racimo** que lleva también una catafilo envainador en su base y 5-10 flores. Las flores son pedunculadas y péndulas, y cada una se encuentra en la axila de una pequeña bráctea. El perigonio, formado por 6 tépalos fusionados, tiene forma de **campana** de color blanco cremoso terminada en 6 lóbulos, y es muy **aromático**. Androceo formado por 6 estambres, fusionados por sus filamentos al perigonio. Gineceo tricarpelar, de ovario súpero que fructifica en una baya roja con 2-6 semillas.

Florece entre la primavera y el verano.

Forma vital: Geófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Bosques húmedos y umbríos, entre 500 y 2000 m, en las montañas septentrionales (Pirineos y Cordillera Cantábrica).

Distribución general:

Europa.

