



## **21. KLASE MAGISTRALA: Sukar konbultsioak. Epilepsia haurtzaroan.**

Krisialdia epileptikoak garuneko neuronen gehiegizko deskargaren ondorioz gertatzen dira, eta pediatriako larrialdi neurologiko arruntenak dira. Ohikoa da paziente bat lehengo krisialdi baten ondoren baloratzea, kontuan hartuta biztanleen %10ek krisialdi bat izango duela. Gehienak mugatuak dira eta haurrak kontsultatzen du krisialdia gainditu ostean, baina garrantzitsua da paziente horiekiko hasierako hurbilketa eta koadro desberdinak diagnostikatzeko eta maneiatzeko gakoak ezagutzea.

### **Gaiaren edukia:**

#### **1. Orokortasunak**

#### **2. Epilepsia haurtzaroan:**

- Hurbilketa diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala. Arazo paroxistiko ez-epileptiko ohikoenak (negar-zotinaren espasmoa, sinkopea)

- Sailkapena:

Partzialak/orokortuak (ILAE 2017 klasifikazioa (International League Against Epilepsy))

Adina:

- ✓ Jaioberriak: Ohtahara sindromea ...
- ✓ Edoskitzailea: haurtzaroko epilepsia familiar onbera, West sindromea, Lennox-Gastaut sindromea ...
- ✓ Eskolakoa, nerabea: absentziak, haurtzaroko epilepsia partzial onbera ...

- Proba osagarrien balioa
- Tratamendua eta profilaxia
- Konplikazioak eta ondorioak

#### **3. Sukar-konbultsioa**

- Orokortasunak
- Hurbilketa diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala
- Proba osagarrien balioa
- Tratamendua

#### **4. Estatus epileptikoa**