

Analgesia eta monitorizazio adibideak - SAGUA

Min maila	Arina	Ertaina	Ertain-larria	Larria
Adibidea	Azalpekoa inplantazioa (ebaki txikia, ≈ 1 zm) Basektomia Larruazaleko biopsia Kateter inplantazioa	Laparotomia sinplea Kraneotomia Implante intraperitoneala Obariektomia	Laparotomia organoen manipulazioarekin Torakotomia (sarbide interkostala) Orno/bizkarrezurreko kirurgia Garuneko erdiko arteriaren oklusioa Zesarea	Organoen erauzketa, laparotomia bidez Organo-transplantea Kirurgia ortopedikoa Hezur minbiziaren ereduak Torakotomia (esternoi bidezko sarbidea)
Analgesia perioperatorioa	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg*, edo Lidokaina 10mg/kg edo krema topikoa	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)
Analgesia postoperatorioa	Meloxicam 5mg/kg (SC) edo Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)	D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 12 h[§] Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 24 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 48 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)	D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 12 h[§] Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 24 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 48 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)	D = 12 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 60 h Buprenorfina 0.1mg/kg (SC) D = 72 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.1mg/kg (SC)
Iraupena	Dosi bakarra	48 h	48 h	72 h
Monitorizazioa	0 eguna: animaliaaren egoera egiaztatu 4-6 ordura 1-3 egunak: animalia egunean behin monitorizatu	0 eguna: animaliaaren egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu	0 eguna: animaliaaren egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu	0 eguna: animaliaaren egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu

* Bupibakaina lidokaina baino egokiagoa izan ohi da, ekintza-denbora luzeagoa duelako eta ebakuntza osteko analgesia eraginkorragoa ekaintzen duelako.

[§] Hanturaren aurkako esteroide gabeko farmakoen erabilerak emaitzak ezkuta ditzakeen kasuetan. Prozeduran justifikatu beharko da.

Analgesia eta monitorizazio adibideak - ARRATOIA

Min maila	Arina	Ertaina	Ertain-larria	Larria
Adibidea	Azalpekoa inplantazioa (ebaki txikia, ≈ 1 zm) Basektomia Larruazaleko biopsia Kateterraren inplantazioa	Laparotomia sinplea Kraneotomia Implante intraperitoneala Obariektomia	Laparotomia organoen manipulazioarekin Torakotomia (sarbide interkostala) Orno/bizkarrezurreko kirurgia Garuneko erdiko arteriaren oklusioa Zesarea	Organoen erauzketa, laparotomia bidez Organo-transplantea Kirurgia ortopedikoa Hezur minbiziaren ereduak Torakotomia (esternoi bidezko sarbidea)
Analgesia perioperatorioa	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg edo krema topikoa	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)	D0 = ebakiaren lekua Bupibakaina 5mg/kg* edo Lidokaina 10mg/kg D1 = jostean Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)
Analgesia postoperatorioa	Meloxicam 5mg/kg (SC) edo Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)	D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 12 h^{\$} Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 24 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 48 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)	D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) D = 12 h^{\$} Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 24 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 48 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)	D = 12 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 24 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 36 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 48 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 60 h Buprenorfina 0.05mg/kg (SC) D = 72 h Meloxicam 5mg/kg (SC) + Buprenorfina 0.05mg/kg (SC)
Iraupena	Dosi bakarra	48 h	48 h	72 h
Monitorizazioa	0 eguna: animalia egoera egiaztatu 4-6 ordura 1-3 egunak: animalia egunean behin monitorizatu	0 eguna: animalia egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu	0 eguna: animalia egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu	0 eguna: animalia egoera egiaztatu 4-6 1-3 egunak: animalia egunean 2 aldiz monitorizatu

* Bupibakaina lidokaina baino egokiagoa izan ohi da, ekintza-denbora luzeagoa duelako eta ebakuntza osteko analgesia eraginkorragoa ekaintzen duelako.

^{\$} Hanturaren aurkako esteroide gabeko farmakoen erabilerak emaitzak ezkuta ditzakeen kasuetan. Prozeduran justifikatu beharko da.