

YACIMIENTO DE AXLOR (DIMA).
Campaña de 1972

El día 3 de Julio de 1972 fuimos a Dima con el fin de realizar una nueva campaña de excavaciones en Axló. Las señoritas María Angeles Alberdi, María Amor Beguiristain y María Inés Tabar y el estudiante Manuel Villar fueron nuestros colaboradores.

Limpiamos la cantera quitando las piedras con que la habíamos, como medida de protección, al finalizar la campaña del año precedente.

En dicho año habíamos excavado en las bandas 5, 7 y 9, alcanzando en las dos primeras la profundidad de -260 cm., proximamente, mientras que en la 9 llegamos hasta los -260 y 280 cm., ateniéndonos a la inclinación de los suelos.

Este año hemos excavado en las bandas 5 y 7, entre los -260 y -280 cm. . Podemos, pues, decir que la parte del relleno excavado corresponde toda ella al estrato IV, que es de tierra arcillosa con algunas piedras calizas.

Los huesos (fragmentos), numerosos en todos los cuadros, forman brecha en el 7D. Entre los -270 y 280 cm. contamos 1.150 esquirlas de hueso, 550 lascas de sílex, 30 de cuarzo y 50 de esquisto.

En la delgada capa de tierra (10 cm.) removida en las bandas 5 y 7 durante esta campaña, aparecieron 2.341 lascas informes de pedernal, 473 de cuarzo, 313 de esquisto, 9 cantos de ocre rojo, varios cristales de roca y una eferita de limonita. A esto hay que añadir más de 300 piezas líticas talladas.

Un inventario de estas piezas va seguidamente.

- 3 lascas levallois (fig. 1: 1, 2, 3),
- 3 puntas levallois retocadas (fig. 1: 4, 5, 6),
- 1 punta pseudolevallois con talón retocado (fig. 1: 7),
- 28 puntas musterienses (fig. 1: 8-20; fig. 2: 1-15),
 - 1 punta alargada (fig. 2: 16),
 - 4 limazas (fig. 2: 17 - 20),
- 35 raederas simples rectas (fig. 3: 1 - 35),
- 56 raederas simples convexas (figs. 4 y 5),
 - 3 raederas simples cóncavas (fig. 6: 1, 2, 3),
 - 2 raederas dobles rectas (fig. 6: 4, 5),
 - 6 raederas dobles recto-convexas (fig. 6: 6 - 11),
 - 2 raederas dobles recto-cóncavas (fig. 6: 12 y 13),
 - 1 raedera doble biconvexa (fig. 6: 14),
 - 2 raederas dobles cóncavo-convexas (fig. 6: 15 y 16),
 - 6 raederas convergentes rectas (fig. 6: 17 - 22),
- 14 raederas convergentes convexas (fig. 7: 1 - 14),
 - 2 raederas ladeadas o desviadas (fig. 7: 15, 16),
- 11 raederas transversales rectas (fig. 7: 17 - 27),
- 30 raederas transversales convexas (fig. 8: 1-26; fig. 9: 1-4),
 - 1 raedera transversal cóncava (fig. 9: 5),
 - 1 raedera lateral-robot (fig. 9: 6),
- 10 raspadores (fig. 9: 7 - 16), de los que dos (los 8 y 11) son carenados, dos frontales cortos (los 13 y 15), uno de morro (el 7),
 - 1 perforador (fig. 9: 17),
 - 2 rasquetas (fig. 9: 18, 19),
- 11 escotaduras (fig. 10: 1 - 11),
- 17 denticulados (fig. 10: 12 - 28),
 - 1 chopper o hendedor unifacial (fig. 11: 1),
- Diversos (fig. 11: 2 - 35),
- 4 piezas de hueso (fig. 12), a modo de punzones.

La fauna obtenida durante las excavaciones practicadas en Julio de 1972 en el yacimiento prehistórico de Axlór se compone de 260 fragmentos determinables, pertenecientes a las siguientes especies:

Zorro (<i>Vulpes vulpes</i>)	1	fragmento
Ciervo (<i>Cervus elaphus</i>)	55	"
Gran Bóvido.	72	"
Cabra montés (<i>Capra pyrenaica</i>) . . .	106	"
Sarrio (<i>Rupicapra rupicapra</i>).	5	"
Caballo (<i>Equus caballus</i>)	21	"

Los restos de Gran Bóvido susceptibles de una ulterior determinación pertenecen a la especie *Bison priscus* (bisonte). La gran parte de ellos, sin embargo, son molariformes o fragmentos muy pequeños, que no permiten distinguir entre el uro y el bisonte.

La distribución de estos restos por los diversos cuadros excavados se expresa en el cuadro siguiente:

	5B	5C	5D	5E	7D	7E	7F	7G
Zorro								1
Ciervo	17	9	7		12	2	1	7
Gran Bóvido	26	10	1	3	11	10	2	9
Cabra montés	22	15	11	1	20	9	1	27
Sarrio	1				3		1	
Caballo	7	3	1		4			6

Profundidad: 265 - 275 bajo el nivel 0.

Aparte de los restos mencionados, en el cuadro 3D a la profundidad de 90 cm. apareció una tibia de *Capra pyrenaica* perteneciente a un animal joven, pues la epífisis proximal no se había soldado todavía.




Fig. 1.—Axlor: lascas, puntas y limazas del nivel IV.




Fig. 2. — Axlor: puntas y limazas del nivel IV.



Fig. 3. — Axlor: raederas rectas del nivel IV.




Fig. 4. — Axlor: raederas convexas del nivel IV.




Fig. 5. — Axlor: raederas convexas del nivel IV.




Fig. 6. — Axló: diversos tipos de raederas del nivel IV.




Fig. 7. — Axló: raederas del nivel IV.




Fig. 8. — Axlor: raederas transversales convexas del nivel IV.




Fig. 9. — Axlor: raederas y raspadores del nivel IV.




Fig. 10.—Axlor: denticulados del nivel IV.




Fig. 11.—Axlor: hendedor y diversas piezas del nivel IV.




Fig. 12.—Axlor: instrumentos (?) de hueso del nivel IV.

EXCAVACIONES EN AXLOR

Campaña 1973