

69. *Urginea maritima* (L.) Baker

Cast.: Cebolla albarrana, escila

Eusk.: Astatipula

*Urginea maritima* (tomada de Kohler 1887)**Caracteres diagnósticos:**

Hierba perenne mediante un **gran bulbo**, globoso (hasta 15 cm de diámetro), enterrado muy superficialmente, que cada año produce una roseta de hojas fotosintéticas y una gran inflorescencia de hasta 1,20 m de altura. Hojas alternas, agrupadas en roseta en el interior del bulbo, no pecioladas, con limbo **lanceolado** de hasta 40 cm de longitud, frecuentemente con márgenes ondulados o retorcido en una espiral laxa. La nerviación es paralela (paralelódromas) y el ápice agudo de márgenes involutos (vuelto hacia el haz). Inflorescencia en **racimo** con muchas flores, cada una de ellas en la axila de una pequeña bráctea lanceolada. Perigonio de 6 tépalos blancos, soldados entre ellos en su extremo basal. Androceo formado por 6 estambres, más cortos que los tépalos. Gineceo tricarpelar, con ovario súpero que fructifica en una cápsula de paredes delgadas y dehiscencia valvar. Semilla **negras**.

Florece en verano y desarrolla las hojas en el otoño, una vez que se han abierto los frutos y dispersado las semillas.

Forma vital: Hemicriptófito.

**Ecología y distribución en la Península Ibérica:**

Matorrales mediterráneos poco densos o en terrenos pedregosos, tanto calcáreos como de naturaleza ácida, en el área mediterránea más cálida de la Península (principalmente el Levante y el Sur).

Distribución general:

Región Mediterránea Occidental.